

DÉPÊCHE - Vendredi 18 octobre 2024 - 17:29

Accouchement: une femme sur trois ressent une douleur sévère à l'expulsion malgré la péridurale

Mots-clés : #gynéco #neuro #congrès #obstétrique-périnatalité #douleur #épidémiologie

NANCY, 18 octobre 2024 (APMnews) - Près d'un tiers des femmes accouchant par voie basse et bénéficiant d'une analgésie péridurale ressentent une douleur sévère à l'expulsion, selon une étude tirée de l'enquête nationale périnatale (ENP) 2021, présentée vendredi au congrès de la Société française de médecine périnatale (SFMP) à Nancy.

L'ENP 2021 a montré que malgré un taux de satisfaction élevé quant à la méthode d'analgésie employée pendant le travail (médicamenteuse, non médicamenteuse ou les deux), une douleur aiguë sévère à l'accouchement est rapportée par de nombreuses femmes.

Clara Rollet de l'équipe de recherche en épidémiologie obstétricale périnatale et pédiatrique (EPOPé) de l'Inserm à Paris et ses collègues ont cherché à préciser la fréquence de la douleur aiguë à l'expulsion sous péridurale et ses déterminants.

Sur 7.211 femmes ayant accouché par voie basse avec une analgésie péridurale, 16,9% ont ressenti une douleur modérée (entre 4 et 6 points sur une échelle numérique graduée de 0 à 10) et 31,4% une douleur sévère (supérieure ou égale à 7 points) à l'expulsion, selon le résumé de la communication.

Les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs associés à la douleur sévère à l'expulsion: l'âge maternel inférieur à 25 ans, associé à un risque (calculé selon la méthode des *odds ratios*) augmenté de 36% de douleur sévère; l'obésité (risque augmenté de 59%), une durée d'efforts expulsifs supérieure à 30 min (+89%), une durée d'action de l'analgésie péridurale inférieure ou égale à 1 h (risque multiplié par 7,41) ou supérieure ou égale à 10 h (+77%), le fait que l'anesthésiste présent ne soit pas dédié à la maternité (+32%).

L'analgésie péridurale auto-contrôlée était un facteur protecteur, associée à un risque réduit de 30% de douleur sévère à l'expulsion.

"Cette étude permet d'identifier des facteurs de risque modifiables dans l'organisation des soins, ainsi que certaines situations cliniques nécessitant une vigilance accrue de la qualité de l'analgésie péridurale", concluent les auteurs.

cd/nc/APMnews

[CD4SLK1TY]

GYNECO-REPRO-UROLOGIE NEUROPSY CONGRÈS

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

©1989-2024 APM International -

<https://www.apmnews.com/depeche/155025/416005/accouchement-une%2%A0femme-sur-trois-ressent-une%2%A0douleur-severe-a%2%A0l-expulsion-malgre-la%2%A0peridurale&usid=155025>

Copyright Apmnews.com